| α/α | Ημ/νία Δειγματοληψίας | Ημ/νία Ανάλυσης | Τοποθεσία | Χρήση | Προέλευση | Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου pH | Αγωγιμότητα - 20 oC | Φθορούχα - F | Θειικά - SO4 | Νιτρικά - NO3 | Νιτρώδη - NO2 | Αμμωνιακά - NH4 | Βόριο - B | Αρσενικό - As | Αντιμόνιο Sb | Κάδμιο - Cd | Χρώμιο - Cr | Χαλκός - Cu | Μόλυβδος - Pb | Υδράργυρος - Hg | Νικέλιο - Ni | Σελήνιο - Se | Νάτριο - Na | Βανάδιο | Βενζο(α)πυρένιο | Επιβλαβείς | Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες P HAS * | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) ** | 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) | Βινυλοχλωρίδιο (C1H2C1H2) | Τρι- & Τετραχλωροαιθυλένιο | Σίδηρος - Fe | Μαγγάνιο - Mn | Βρωμικά - BrO3 | Ακρυλαμίδιο | Χλωριούχα - Cl | Χλωρικά | Διοξειδίο Α | Μεροκυττάρι - LR | Χλωριούχα | Ηλιόγενα PFAS *** | Αλογονοειδικά οξέα (HAAS) | Κυανιούχα (CN) | Ουράνιο (U) | Αγκίλιο - Al | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | Σύνολο Παρακατιόντων | Υπολειμματικό Χλώριο | Αριθμός Αποικιών, 22°C | Αριθμός Αποικιών, 37°C | Ολικά Κολοβακτηριακοί | Escherichia | Clostridium Perfringens | E.coli | Θερμοκρασία | Θολότητα | Χρώμα | Γεύση | Οσμή |
|---|---|---

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ο/Τ |
| | | | | | | Ημ/νία Δειγματοληψίας |
| | | | | | | Ημ/νία Ανάλυσης |
| | | | | | | Τοποθεσία |
| | | | | | | Χρήση |
| | | | | | | Προέλευση |
| 6,5 - 9,5 | Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH** | | | | | |
| <2500 (μS/cm) | Αγωγιμότητα - 20 oC | | | | | |
| <1,5 mg/L | Φθοριούχα - F | | | | | |
| <250 mg/L | Θειικά - SO4 | | | | | |
| < 50 mg/L | Νιτρικά - NO3 | | | | | |
| <0,5 mg/L | Νιτρώδη - NO2 | | | | | |
| <0,5 mg/L | Αμμωνιακά - NH4 | | | | | |
| <1,5 mg/L | Βόριο - B | | | | | |
| <10 μg/L | Αρσενικό - As | | | | | |
| <10 μg/L | Αντιμόνιο -Sb | | | | | |
| <5 μg/L | Κάδμιο - Cd | | | | | |
| <50 μg/L | Χρώμιο - Cr | | | | | |
| <2,0 mg/L | Χαλκός - Cu | | | | | |
| <10 μg/L | Μόλυβδος - Pb | | | | | |
| < 1,0 μg/L | Υδράργυρος- Hg | | | | | |
| <20 μg/L | Νικέλιο - Ni | | | | | |
| <20 μg/L | Σελήνιο - Se | | | | | |
| <200 mg/L | Νάτριο - Na | | | | | |
| <1,00 μg/L | Βενζόλιο | | | | | |
| <0,010 μg/L | Βενζο(a)πυρένιο | | | | | |
| μg/L | Επιχλωρυδρίνη | | | | | |
| <0,10 μg/L | Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS * | | | | | |
| <100 μg/L | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) ** | | | | | |
| <3 μg/L | 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) | | | | | |
| μg/L | Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) | | | | | |
| <10 μg/L | Trι & Τετραχλωροαιθυλένιο | | | | | |
| <200 μg/L | Σίδηρος - Fe | | | | | |
| <50 μg/L | Μαγγάνιο - Mn | | | | | |
| <10 μg/L | Βρωμικά - BrO3 | | | | | |
| μg/L | Ακρυλαμίδιο | | | | | |
| <250 mg/L | Χλωριούχα - Cl | | | | | |
| <0,25 mg/L | Χλωρικά | | | | | |
| < 2,5 μg/L | Διοφανόλη Α | | | | | |
| <1 μg/L | Μικροκυστίνη - LR | | | | | |
| <0,25 mg/L | Χλωρώδη | | | | | |
| <0,10 μg/L | Άθροισμα PFAS *** | | | | | |
| <60 μg/L | Αλογονοοξικά οξέα (HAAS) | | | | | |
| <50 μg/L | Κυανιούχα (CN) | | | | | |
| <30 μg/L | Ουράνιο (U) | | | | | |
| <200 μg/L | Αργίλιο - Al | | | | | |
| mg/L (Αν ευ ασυνήθους μεταβολής) | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | | | | | |
| < 0,5 μg/L | Σύνολο Παρασιτοκτόνων | | | | | |
| mg/L | Υπολειμματικό Χλώριο | | | | | |
| cfu/mL (Αν ευ ασυνήθους μεταβολής) | Αριθμός Αποικιών, 22°C | | | | | |
| cfu/mL (Αν ευ ασυνήθους μεταβολής) | Αριθμός Αποικιών, 37°C | | | | | |
| cfu/100mL / 0 | Ολικά Κολοβακτηριοειδή | | | | | |
| cfu/100mL / 0 | Εντερόκοκκοι | | | | | |
| cfu/100mL / 0 | Clostridium Perfringens | | | | | |
| cfu/100mL / 0 | E.coli | | | | | |
| oC | Θερμοκρασία | | | | | |
| NTU | Θολότητα | | | | | |
| PtCo (Hazen) | Χρώμα | | | | | |
| | Γεύση | | | | | |
| | Οσμή | | | | | |

Χρωτό

7/9/2026